

# اپنے بچے کو چھاتی سے دودھ پلانا



## نئی ماں کے لیے اہم معلومات



## يونیسیف اور طفل دوست اقدام

يونائیڈ نیشنز چلدرن فاؤنڈیشن "يونیسیف"، "بر بچے کو اپنی پوری نشوونما تک پہنچانے" میں مدد کے لئے عالمی سطح پر کام کر رہا ہے۔ ہم 160 سے زائد ملکوں میں کام کرتے ہوئے ان پروگراموں کو تعاون دیتے ہیں جو بچوں کو فراہم کرتے ہیں:

- بہتر صحت اور تغذیہ
- محفوظ پانی اور حفاظان صحت
- تعلیم



يونیسیف ان بچوں کی بھی مدد کرتا ہے جنہیں خصوصی تحفظ درکار ہو مثلًا طفل مزدور اور جنگ سے متاثر بچے۔

طفل دوست اقدام یونیسیف اور عالمی ادارہ، صحت کا عالمگیر پروگرام ہے جو خدماتِ صحت کے ساتھ مل کر اس کام کو بہتر بنانے کے لیے کوشان ہے۔ نگداشت صحت کے مراکز جو چھاتی سے دودھ پلانے کی کامیاب کوششوں کے طریقے اختیار کرتے ہیں یونیسیف /

To make a credit card donation to UNICEF, call  
**08457 312 312**  
(Charged at local rate. Lines open 24 hours. Please quote 'BFI'.)

ڈبلیو ایچ او کے مؤقر طفل اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ برطانیہ میں خدمتِ صحت کے مختلف شعبے "طفل دوست اقدام" کو مشورہ، تعاون، ٹریننگ، نیٹ ورکنگ، جائزہ اور سند اعتماد میں تعاون دیتے ہیں۔

چھاتی سے دودھ پلانے سے متعلق معلومات مقامی طور پر دستیاب ہے:

Translated, Typeset and Printed by: Print Point (UK) Ltd (0121) 706 22701

چھاتی سے دودھ پلانے میں تعاون کے لیے مقامی جماعتوں کی رابطہ جاتی تفصیلات صفحہ 14 پر دی گئی ہیں۔

This leaflet is produced by UNICEF Enterprises Ltd, a company which covenants to pay all its net profits to UNICEF. This translation has been funded by Birmingham Health Authority. Cover & page 15 photos: Nancy Durrell McKenna. For more information about UNICEF's work worldwide, or to make a donation, contact: UNICEF, Room BFI, Freepost, Chelmsford CM2 8BR. UNICEF is a Registered Charity, No. 1072612. For more information about the Baby Friendly Initiative, visit our web site at [www.babyfriendly.org.uk](http://www.babyfriendly.org.uk) or call 020 7312 7652.

## تعارف

یہ کتابچہ ان ماؤں کے لئے ہے جو چھاتی سے دودھ پلانے کی ابتداء کر رہی ہیں۔ آپ کو اس میں چھاتی سے دودھ پلانے اور عام مشکلات سے بچنے کے طریقوں کے بارے میں معلومات ملیں گی۔ چھاتی کے دودھ کے اخراج کے بارے میں ایک علاحدہ باب بھی دیا گیا ہے۔ کسی غلط فہمی سے بچنے کے لیے ہم نے بچے کے لیے صیغہ، واحد غائب یعنی ”وہ“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔

چھاتی سے دودھ پلانے کا عمل آسان اور زیادہ تر ماؤں اور بچوں کے لیے بہت پر لطف تجربہ ہو جاتا ہے۔ تاہم پہلے چند دنوں میں آپ دونوں کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ کو اس کی مشق کی ضرورت ہو گئی اور اگر ضرورت پڑے تو مذوائقہ سے مدد اور مشورہ لینا ہوگا۔ (اگر آپ اپنے بچے کو بوتل سے دودھ پلانا شروع کر چکی ہیں اور اب چھاتی سے دودھ پلانے کے طریقے کو اختیار کرنا چاہتی ہیں تو یہ اب بھی ممکن ہے لیکن یہ کام ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں آپ مذوائقہ یا چھاتی سے دودھ پلانے والے معاون معاون شخص سے بات کریں۔

یاد رکھیں :

آپ کی چھاتی کا دودھ آپ کے بچے کے لیے مکمل غذا ہے اور آپ کے بچے کی بدلتی ہموئی ضروریات کی تکمیل کے عین مطابق ہے۔ زیادہ تر بچوں کو تقریباً چہ ماہ کے ہو جانے تک کسی دیگر غذا یا مشروب کی ضرورت نہیں پڑتی۔

## چھاتی سے دودھ پلانے کی اتنی خاص اہمیت کیون ہے؟

چھاتی کے دودھ میں آپ کے بچے کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے والے ضد جسمیے (antibodies) موجود ہوتے ہیں۔ جن بچوں کو بوتل سے دودھ پلایا جاتا ہے ان میں دست (گیسٹرواینترائلس جو بہت خطرناک ہو سکتا ہے)، سینے، کان اور پیشاب کی بیماریوں کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے۔ ایکریما، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے امکانات چھاتی سے دودھ پینے والے بچوں کی بنسپت زیادہ ہوتے ہیں۔

چھاتی سے دودھ پلانے کے عمل سے آپ کے بچے کی نشوونما میں۔ برابر فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ تحقیقات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ چھاتی سے دودھ پینے والے بچوں کی ذہنی نشوونما بہتر رہتی ہے۔ جن بچوں کو شیر خواری کے زمانے میں بوتل سے دودھ پلایا جاتا ہے انہیں چھاتی سے دودھ پلانے جانے والے بچوں کے مقابلے میں اکریما اور ذیابیطس کا خطرہ زیادہ لاحق رہتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کی علامات ان میں مقابلتاً زیادہ ہوتی ہیں۔

چھاتی سے دودھ پلانا ماؤں کے لیے بھی اچھا ہے۔ اس سے آپ کو دوران حمل وزن میں ہوئے اضافے کو گھٹانے میں مدد ملتی ہے۔ یہ آپ کو چھاتی اور بچے دانی کے کینسر سے حفاظت میں مدد کر سکتا ہے اور آئندہ زندگی میں آپ کی ہڈیوں کو مضبوط تر بناتا ہے۔

مندرجہ ذیل معلومات ایک اچھی شروعات کرنے میں آپ کی مدد کریں گی۔



## گھر میں چھاتی کا دودہ جمع کرنا

چھاتی کا دودہ 3 سے 5 دنوں تک ریفریجریٹر میں  $2-4^{\circ}\text{C}$  درجہ، حرارت پر رکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے ریفریجریٹر میں تھرمومیٹر نہیں ہے تو شاید بہترین احتیاط یہ ہو گئی کہ چھاتی کا دودہ جو آپ 24 گھنٹوں میں استعمال نہ کریں منجمد کر دیں۔ چھاتی کا دودہ ریفریجریٹر کے آئس کمپارٹمنٹ میں ایک ہفتے اور فریزر میں تین ماہ تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔

گھر میں حسب موقع استعمال کی غرض سے چھاتی کا دودہ منجمد کرنے کے لیے پلاسٹک کا کوئی ڈبہ استعمال کیا جا سکتا ہے بشرطیکم اس کی سیل ہو ابند ہو اور اس کو جراثیم کش دوائی سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ ہر ڈبے پر تاریخ لکھنا اور لیبل لگانا اور انہیں باری استعمال کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ اس وجہ سے چھاتی کا دودہ جما رہی ہیں کہ آپ کا بچہ قبل از وقت پیدا ہوا ہے یا بیمار ہے تو اس کی نگہداشت پر مامور عملے سے مشورہ طلب کریں۔ اگر آپ کے پاس سیل ڈی فرستنگ فریزر ہے تو دودہ کو ہر ممکن حد تک ڈی فرستنگ تار (element) سے دور رکھیں۔

منجمد دودہ ریفریجریٹر یا روم ٹمپریچر پر گرم کرنا چاہیے۔ ایسے گرم کئے ہوئے چھاتی کے دودہ کو ریفریجریٹر میں محفوظ کر کے 24 گھنٹے تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار اسے روم ٹمپریچر پر گرم کرنے کے بعد یا تو استعمال کر لینا یا پھر پہنچ دینا چاہیئے۔ چھاتی کے دودہ کو دوبارہ کبھی نہیں جمانا چاہیئے۔

چھاتی کے دودہ کو مائیکرو وبو میں گرم نہیں کرنا چاہیئے کیونکہ اس سے دودہ کا درجہ، حرارت بڑھ سکتا ہے جو بچے کا منہ جلا سکتا ہے۔

## مزید معلومات کس سے طلب کریں

اگر اپنے بچے کو دودہ پلانے سے متعلق آپ کو مزید کوئی معلومات درکار ہو تو آپ کی مذوائقہ یا سیلچہ وزیر آپ کی مدد کریں گے۔

مذوائقہ آپ کو چھاتی سے دودہ پلانے سے متعلق مقامی تربیت یافتہ صلاح کاروں کا فون نمبر دے سکتی ہے (اس کتابچے کی پشت کے صفحے پر جگہ دی ہوئی ہے) بصورتِ دیگران کے قومی دفاتر آپ کو یہ معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔

National Childbirth Trust, Alexandra House, Oldham Terrace, London W3. 0870 444 8708

Breastfeeding Network, PO Box 11126, Paisley PA2 8YB. 0870 900 8787.

La Leche League, BM 3424, London WC1N 3XX. Tel: 020 7242 1278.

Association of Breastfeeding Mothers, PO Box 207, Bridgwater TA6 7YT. 020 7813 1481.

## اپنے بچے کا منہ چھاتی سے لگانا

### آپ کی پوزیشن

یہ بات اسی ہے کہ آپ آرام دہ پوزیشن اختیار کریں۔


اگر آپ نیچے بیٹھ کر دودہ پلا رہی ہیں تو یقین رہے کہ:

■ آپ کی کمر سیدھی ہو اور اسے سیارا مل رہا ہو

■ آپ کی گود پوری طرح سموار ہو

■ آپ کے پیر سیدھے ہوں۔ (آپ کو کسی پڑے یا موٹی کتاب کی ضرورت پڑ سکتی ہے)

■ ضرورت پڑنے پر آپ کے پاس فاضل تکے ہوں تاکہ کمر اور باہوں کو سیارا مل سکے یا آپ بچے کو اوپر کر سکیں





پوری طرح سیدھی لیٹنے کی کوشش کریں اس طرح کہ آپ کے سر کے نیچے تکیہ ہو اور آپ کا کندھا بسترپر ہو۔

ایک کروٹ اچھی طرح لیٹیں۔ کمر کے بیچھے تکیہ کا سیارا لیں اور ایک تکیہ ٹانگوں کے درمیان رکھیں۔ اس سے آپ کو اچھی طرح لیٹنے میں مدد ملے گی۔

(ایک بار جب آپ کا بچہ اچھی طرح چھاتی سے دودہ پینے لگے گا تو آپ اسے آرام سے کہیں بھی تکیے کی ضرورت پڑے بغیر دودہ پلا سکیں گی۔)


## دستی پمپ

ہینڈ پمپ کا استعمال اس وقت آسان تر ہوتا ہے جب آپ کے پستان نرم کے بجائے بھرے ہوئے ہوں۔ ہینڈ پمپ کی بہت سی مختلف شکلیں ہیں اور وہ سب قدر الگ الگ طریقوں سے کام کرتے ہیں۔ کسی کو ماتھ سے چلايا جاتا ہے اور کسی کو بیٹری سے۔ ان سب میں ایک قیف لگی ہوتی ہے جو پستان اور اس کے اطراف بنے ہالے پر فٹ ہو جاتی ہے۔ مختلف اقسام کے پمپ مختلف عورتوں کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ممکن ہو تو خریدنے سے پہلے پمپ کی آزمائش کر لیں۔



## برقی پمپ

یہ پمپ کام کرنے میں تیز رفتار اور آسان ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ چلتے ہیں۔ یہ خصوصاً اس وقت اچھے رہتے ہیں جب آپ لمبے وقفے کے لیے دودھ خارج کرنا چاہیں مثلاً اگر آپ کا بچہ اسپیشل کیئر سے بی یونٹ میں ہے۔ اور آپ کو یومیہ 24 گھنٹوں میں 6-8 مرتبہ دودھ کا اخراج کرنا ہے۔ جس میں ایک بار رات کے دوران کا اخراج بھی شامل ہے۔




برقی پمپ کے ذریعے بیک وقت دونوں پستانوں سے اخراج ممکن ہے۔ یہ دیگر طریقوں کے مقابلے میں تیز تر ہوتا ہے اور آپ کے دودھ کی مزید پیداوار میں مدد گار ہو سکتا ہے۔ ایسے پمپ میں آپکو دوسرے پمپنگ سیٹ بیکر سیٹ یا دو اکبرے پمپنگ سیٹ اور ایک ٹی کنیکٹر (T connector) کی ضرورت ہوتی ہے۔

اگر آپ دستی یا برقی پمپ استعمال کریں تو مینوفیکچر کی مددیات پر پورے دھیان سے عمل کریں۔

## آپ کے بچے کی پوزیشن

بچے کو صحیح طریقے سے پکڑ کر چھاتی سے دودھ پلانے کے مختلف طریقے ہیں۔

ہم یہاں دودھ پلانے کے وہ طریقے بتا رہے ہیں جن سے بچہ دودھ اچھی طرح پی سکتا ہے ان طریقوں میں سے آپ جو بھی چاہیں منتخب کر سکتی ہیں۔




1. بچہ آپ کے قریب ہونا چاہیئے۔

2. اس کامنہ چھاتی کے سامنے ہو اور سر، کندھی اور جسم سیدھی لائیں میں ہوں۔

3. اس کی ناک یا اوپری ہونٹ پستان کی چوچی (نیل) کے مقابلہ ہوں۔

4. وہ خود کو کھینچے یا مرٹے بغیر چھاتی تک بأسانی پہنچ سکے۔

5. ہمیشہ یاد رکھیں کہ بچے کو چھاتی کی طرف لائیں نہ کہ اپنی چھاتی کو بچے کی طرف۔



اس طرح کم:

■ بچے کا پیٹ مار کے پیٹ سے لگے

■ بچے کی ناک پستان کی چوچی (نیل)

■ سے لگے

■ بچے کو چھاتی کی طرف لایا جائے


■ نہ کہ چھاتی کو بچے کی طرف



## ہاتھ سے دودھ کے اخراج کے طریق

### اپنے بچے کے منہ کو چھاتی سے لگانا

یہ خیال رکھنا بہت اہم ہے کہ بچہ چھاتی کو منہ میں اچھی طرح تھامے رہے ورنہ دودھ پیتے وقت اسکو دودھ کی مناسب مقدار نہیں پہنچے گی اور آپکی چوجی میں درد کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔



اپنے بچے کو صفحہ 4 پر دکھائی گئی پوزیشن میں رکھیں اس طرح کہ اس کی ناک یا اوپری ہونٹ آپ کی چوجی کے مقابل ہو۔

انتظار کریں تا وقت کہ بچہ اپنا منہ واقعی کشادہ نہ کھول دے (اسے منہ کھولنے پر آمادہ کرنے کے لئے اپنی چوجی سے اس کے ہونٹ کو آہستہ سے مس کریں)۔

پھر جلدی سے اسے اپنی چھاتی کی طرف اس طرح سر کائیں کہ اسکا نچلا ہونٹ چھاتی کو وہاں چھوئے جہاں چوجی کی جڑِ ممکنہ حد تک دور ہو۔ اس طرح آپ کی چوجی کا رخ اس کے تالو کی طرف رہیگا۔

جب بچہ اچھی طرح آپ کی چھاتی کو منہ میں لے لیتا ہے تو آپ دیکھیں گی کہ:


- اس کا منہ پورا کھلا ہوا ہے اور چھاتی بوری طرح اس کے منہ میں ہے

- اس کی تھوڑی چھاتی کو چھوڑی سے ہے

- اس کا نچلا ہونٹ پیچھے کی طرف مڑا ہوا ہوتا ہے

- اگر آپ چوجی کے ہمالے (چوجی کے اطراف کتھی جلد) کو دیکھنا چاہیں تو نچلے ہونٹ کے مقابلے میں اوپری ہونٹ کے اوپر کا حصہ زیادہ دکھائی دیگا۔

- اس کے چوسنے کے انداز میں تبدیلی ہونٹ لگتی ہے۔ مختصر چسکیاں وقفہ سے لمبی اور گہری ہو جاتی ہیں۔





1. اپنی پہلی انگلی چھاتی کے نیچے بھٹنی کے ہمالے کے سرے کی طرف اور اپنا انگوٹھا چھاتی پر پہلی انگلی کے مقابل رکھیں (آپ دودھ کے ذخیروں کو جلد کے نیچے محسوس کر سکتی ہیں)۔ اگر آپ کی بھٹنی کا ہمالہ بڑا ہے تو انگلی کو سرے سے ذرا اندر رکھیں (اگر آپ کی بھٹنی کا ہمالہ چھوٹا ہے تو آپ انگلی کو تھوڑا باہر کی طرف رکھیں) چھاتی کو سیہارا دینے کیسے لیے انگلیوں کا استعمال کریں (C)

2. اپنی انگلی اور انگوٹھے کو اپنی جلد پر انہی جگہوں پر رکھتے ہوئے آہستہ سے پیچھے کی طرف دبائیں۔

3. اس پیچھے کی طرف ہلکے دباؤ کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے انگوٹھے اور پہلی انگلی کو ایک ساتھ اور آگے کی طرف دبائیں تاکہ دودھ ذخیروں سے نکل کر بھٹنی کی طرف آئے لگے (D)


4. گرفت ڈھیلی کر دیں اور ذخیروں میں دو بارہ دودھ بھر جانے دیں اور پھر مراحل 2 اور 3 کو 5 مہرائیں۔



ایک بار طریقہ سمجھہ آجائے کہ بعد 2 سے 4 تک کے مراحل کو پورا کرنے میں چند سیکنڈوں سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ آپ ایک مستحکم روانی پیدا کر لیں گی اور چھاتی سے دودھ کے قطرے اور شاید پھوار نکلنے لگے گی۔

## ساتھ سے دودھ کا اخراج

دودھ کے اخراج کا بہت سستا اور سہل طریقہ ہے۔ خاص طور سے دکھتی ہوئی چھاتی کو خالی کرنے کے لیے بہت مفید ہے یہاں دی ہوئی هدایات صرف آپ کی رہنمائی کے لیے ہیں ورنہ ساتھ سے دودھ کے اخراج کا عمل مشق سے زیادہ اچھی طرح سیکھا جا سکتا ہے (شاید غسل خانہ میں) تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کس طریقے کو اپنا آپ کے لیے کار آمد ہے۔ دودھ کا ذخیرہ



چوجھی کے ہالے (چوجھی کے ارد گرد گھری رنگت کی جلد) کے نیچے عموماً سروں کی طرف دودھ کے چھوٹے ذخیرے ہوتے ہیں۔

دودھ کے ذخیروں کی بناؤٹ چھوٹے چھوٹے مٹر کے دانوں کی طرح ہوتی ہے جنہیں جلد کے نیچے محسوس کیا جا سکتا ہے دودھ ان ذخیروں میں اکٹھا ہوتا ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ دودھ کا اخراج کرتی ہیں۔

ہر چھاتی تقریباً 15 حصوں (آگے نکلے ہوئے گوشوں) میں منقسم ہوتی ہے اور ہر ایک کا اپنا دودھ کا ذخیرہ ہوتا ہے۔

نیل کونہ دبائیں کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ایسا کرنا درد کا باعث ہوتا ہے۔

احتیاط رکھیں کہ انگلیاں چھاتی پر ایک طرف سے دوسری طرف نہ چلائیں کیونکہ اس سے چھاتی کے نازک نسیجیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

دودھ کے بہنے میں ایک سے دو منٹ کا وقت لگ سکتا ہے۔

انگلیوں کا چھاتی پر گھمانا بہت اہم ہے اور تب ہی آپ تمام گوشوں (lobes) سے پورا دودھ نکال پائیں گی۔

اخراج کئے دودھ کو کسی جراثیم سے پاک شدہ لمبے منہ والے ڈبے میں اکٹھا کرنا بہتر ہے۔ ناپسے والا جگ اس کام کیے لیے بہت موزوں ہے۔

مشق ہو جانے پر بیک وقت دونوں چھاتیوں سے دودھ کا اخراج ممکن ہے۔

دودھ پلانے کا عمل تکلیف دہ نہیں ہونا چاہیئے۔ البتہ جب آپ کا بچہ چھاتی سے دودھ پلانا اور پینا سیکھ رہے ہوتے ہیں اور بچہ پہلی بار چھاتی سے منہ لگاتا ہے تو تھوڑی تکلیف اور دقت ہوتی ہے مگر یہ احساس جلد ہی ختم ہو جانا چاہیئے اور پھر دودھ پلانا تکلیف دہ نہیں رہ جاتا۔ لیکن اگر تکلیف برقرار رہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ شاید چھاتی سے اچھی طرح منہ نہیں لگا پا رہا ہے۔ اگر ایسا ہو تو اپنی چھاتی کو آہستگی سے دباتے ہوئے بچہ کے منہ سے نکال لیں تاکہ بچہ کو علیحدہ کرتے وقت چسکی کا عمل موقف ہو جائے۔ اب بچے کو دو بارہ چھاتی سے اچھی طرح لگنے میں مدد کریں۔ اس اقدام کے باوجود بھی اگر درد ختم نہ ہو تو مذکوٰف کی مدد طلب کریں۔

## چھاتی سے دودھ پلانے کے کامیاب اشارے

اپنے بچے کو خود سے قریب رکھنے کی کوشش کریں، خصوصاً پہلی بار اس طرح آپ اسے خوب جان جائیں گی اور جلد ہی سمجھ لیں گی کہ کب اسے دودھ پینے کی ضرورت ہے۔ یہ بات خاص طور پر رات کے لیے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ کا بچہ آپکے ساتھ ہے تو آپ دونوں کو زیادہ حمت نہیں ہوتی۔ آپ بچہ کو دودھ پینے کے لیے اٹھا سکتی ہیں اور پھر آپ دونوں جلد ہی دو بارہ سو سکتے ہیں۔



NANCY DURRELL McDENNIN

چھاتی کے دودھ میں وہ تمام غذائی اور آبی اجزاء شامل ہوتے ہیں جن کی ضرورت آپ کے بچے کو ہے۔ کوئی دیگر غذا یا مشروب دینا اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اور چھاتی سے دودھ پینے میں اس کی دلچسپی میں کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ اکثر پورا دودھ نہ پینے کی وجہ سے آپ کے جسم میں بھی پورا دودھ نہیں پیدا ہوتا اور بچہ کی مستقبل کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتیں۔ اس لیے بچہ جب بھی بھوکا نظر آئے فوراً اس کا منہ چھاتی سے لگا دیں۔

چھاتی سے دودھ پلانے والی ماوں کو شروع کے بفتون میں زیادہ تر مشکلات (مثلاً بھٹنی میں درد، خون کا کثثرت سے مجتمع ہونا اور پستان میں ورم) یا تو اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ بچہ چھاتی سے ٹھیک طرح نہیں لگایا جاتا یا پھر اسکو پوری طرح سے دودھ نہیں پلایا جاتا۔ ان باتوں کو اگر آپ وثوق سے نہیں سمجھ پا رہی ہوں تو مدد طلب کریں۔ مدد حاصل کرنے سے متعلق معلومات اس پرچم کی پشت پر دی گئی ہے۔





## چھاتی کے دودہ کو بھاؤ پر مائل کرنا :

جہاں تک ممکن ہو آرام اور سکون سے رہنے کی کوشش کریں۔ کسی پُرسکون کمرے میں بیٹھ کر کوئی گرم مشروب پینا مدد گار ہو سکتا ہے۔

اپنے بچے کو قریب رکھیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو اپنے بچے کی تصویر پاس رکھیں اور س کی طرف دیکھتی رہیں۔

دودہ کے اخراج سے پہلے گرم پانی سے نہالیں یا پھوار ڈال لیں، یا اپنی چھاتیوں پر گرم پانی میں بھیگا تولیم پھیر لیں۔



آہستہ سے اپنی چھاتیوں کو ملیں۔ یہ کام آپ اپنی انگلی کے اگلے پوروں سے کر سکتی ہیں (A) یا اپنی بند مہٹی چھاتی سے بھٹنی کی طرف پھیریں (B)۔ نیچے کے حصے کو شامل کرتے ہوئے پوری چھاتی پر مٹھی بھیریں۔ اپنی انگلیاں چھاتی پر نہ رکڑیں کیونکہ اس سے جلد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

اپنی چھاتی کو ہلکے مالش کرنے کے بعد اپنی بھٹنی کو پہلی انگلی اور انگوٹھی کے درمیان گھمائیں۔ اس سے ہماروںکو کے اخراج میں مدد ملتی ہے جو دودہ پیدا کرنے اور خارج ہونے کے عمل کو ترغیب دیتے ہیں۔

جون جون آپ کو دودہ کے اخراج کی عادت پڑائیں آپ محسوس کریں گی کہ اس عمل کے لیے احتیاط کے ساتھ تیار ہونے کی ضرورت نہیں۔ چھاتی سے دودہ پلانے کی طرح یہ کام بھی مشق سے بہت آسان ہوجاتا ہے۔

چھاتی سے دودہ کے اخراج کا آپ جو طریقہ بھی چاہیں اپنا سکتی ہیں۔ تاہم آپکو یہ معلوم ہونا چاہیئے کہ ایک چھاتی سے دودہ کا لگاتار اخراج صرف چند منٹ ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا چھاتی پر جانا پڑتا ہے اور پھر واپس پہلی چھاتی پر۔ یہ چھاتیوں کی ادلی بدلتی اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کہ دودہ نکلنا بند نہ ہو جائے یا دودہ کے بہت ہلکے قطرے ہی نکلیں۔



NANCY DURRELL MCKENNA

آپ کو اور آپ کے بچے کو ایک بار چھاتی سے دودہ پلانے اور پینے کی عادت پڑانے کے بعد یہ کام عموماً بہت آسان ہوجاتا ہے۔ دودہ میں صحیح درجہ حرارت پر دستیاب رہتا ہے۔ در حقیقت، اس بارے میں کچھ سوچنے کی بلکل ضرورت نہیں رہتی۔ بچہ خود آپ کو بتا دیتا ہے کہ دودہ پینے کا اگلا وقت کب ہوگا۔

**چھاتی سے دودہ پلانے کے دوران آپ کو کوئی مخصوص غذا کھانے کی ضرورت نہیں بلکہ دیگر خواتین کی طرح متوازن غذا کھانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح عموماً یہ بھی ضروری نہیں کہ مخصوص غذاؤں سے پرہیز کیا جائے۔**

## اپنی چھاتی کے دودھ کا اخراج

### آپ کو اپنا دودھ خارج کرنی کی ضرورت کیون پیش آسکتی ہے؟

- اگر آپ بچے کی مدد کرنا چاہیں کہ وہ دودھ سے بھری چھاتیوں کو منہ لگا سکے۔
- اگر آپ کی چھاتیاں بھر گئی ہوں اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہو۔
- اگر آپ کا بچہ اتنا چھوٹا یا بیمار ہے کہ آپ اسے چھاتی سے دودھ نہیں پلا سکتیں۔
- اگر آپ اپنے بچے سے ایک یا دو گھنٹے سے زیادہ وقت کے لیے دور رہیں مثلاً کسی سماجی تقریب میں
- اگر آپ کام پر واپس جانے لگیں۔

## دودھ کے اخراج کے طریقے

چھاتی کے دودھ کے اخراج کے تین خاص طریقے ہیں:

- ہاتھ کے ذریعے
- دستی پمپ کے ذریعے
- بر قی پمپ کے ذریعے

آپ جو بھی طریقہ اختیار کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ اخراج سے پہلے اپنے ہاتھ اچھی طرح دھولیں۔ تمام ڈسے یوتلیں اور پمپ کے حصے گرم صابن کے پانی سے دھولیں اور استعمال سے پہلے ان کی جراحتی کشی کر لیں۔

## چھاتی سے دودھ پلانے میں تسلسل

چھاتی سے دودھ پلانا آپ کو اور آپ کے بچے کو باہر جانے اور زندگی کا لطف لینے سے نہیں روکتا۔ آپ تقریباً ہر جگہ اپنے بچے کو چھاتی سے دودھ پلا سکتی ہیں۔ اگر آپ ڈھیلا لباس پہنیں تو اس فکر کے بغیر دودھ پلا سکتی ہیں کہ آپ کی چھاتیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ شروع میں آپ کو تھوڑی سے دشواری محسوس ہو گی لیکن جلد ہی آپ محسوس کریں گی کہ آپ میں زیادہ اعتماد پیدا ہو گیا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس بات کی طرف دھیان بھی نہیں دیں گے کہ آپ چھاتی سے دودھ پلا رہی ہیں۔ مزید اعتماد پیدا کرنے کے لیے آپ گھر میں آئینے کے سامنے چھاتی سے دودھ پلانے کی مشق کر سکتی ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ کچھ دن بھوکا رہ جائے اور آپکی چھاتیوں میں پورا دودھ اترنے کے دوران ایک یا دو دن وہ بار بار زیادہ دودھ مانگے۔ ایسی صورت میں وہ جب بھی بھوکا ہو اسے دودھ پلاتیں تاکہ آپ کے دودھ کی سپلائی جلد پوری ہو سکے۔ اور پھر دو بارہ یاد رکھیں:

زیادہ بار چھاتی سے دودھ پلانا = زیادہ اشارے = زیادہ دودھ



NANCY DURRELL MCKENNA

بس اوقات ایسا ہو سکتا ہے آپ کو بچے کے بغیر باہر جانا ہو یا آپ واپس کام پر جانا شروع کر دین تو ایسے وقت آپ کو دودھ پلانا روکنا پڑے۔ لیکن ایسے موقعوں کے لیے دودھ کا اخراج کار آمد ہوتا ہے کیونکہ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی اور بچہ کو آپ کا دودھ پلا سکتا ہے چھاتی سے دودھ نکالنے سے متعلق معلومات اس پرچم میں (صفحہ 9 پر) دی گئی ہے۔

جب تک بچہ کوئی ٹھووس غذا کھانے کے قابل نہ ہو اسے کھلانے کی کوشش نہ کریں۔ سب بچے مختلف ہوتے ہیں۔ چہ ماہ کی عمر کے قریب آپ کا بچہ غالباً چیزوں کی طرف لپکنے انہیں پکڑنے اور منہ میں رکھنے لگے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ سخت ڈھانیں کھانے کے قابل ہو رہا ہے۔

صرف چھاتی کا دودھ پلانے سے بچے کو تقریباً پہلے 6 ماہ میں درکار تمام غذا اور مشروب کی فراہمی ہو جاتی ہے اور اس سے مختلف اقسام کی بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ بہت سی مائیں اس سے زیادہ عرصہ تک بھی چھاتی سے دودھ پلاتی رہتی ہیں۔ بعض دوسرے سال اور اس سے زیادہ عرصہ بھی یہ عمل جاری رکھتی ہیں۔ چھاتی سے دودھ پلانا آپ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے اور آپ جب تک چاہیں اسے جاری رکھ سکتی ہیں۔